

**ISSN 2518-1629 (Online),
ISSN 2224-5308 (Print)**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

Х А Б А Р Л А Р Ы

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Казахский национальный медицинский
университет им. С. Д. Асфендиярова

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Asfendiyarov
Kazakh National Medical University

**SERIES
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL**

2 (338)

MARCH – APRIL 2020

PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

ALMATY, NAS RK

Б а с р е д а к т о р

ҚР ҰҒА академигі, м. ф. д., проф.
Ж. А. Арзықұлов

Абжанов Архат, проф. (Бостон, АҚШ),
Абелев С.К., проф. (Мәскеу, Ресей),
Айтқожина Н.А., проф., академик (Қазақстан)
Акшулаков С.К., проф., академик (Қазақстан)
Алшыныбаев М.К., проф., академик (Қазақстан)
Бәтпенов Н.Д., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Березин В.Э., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Берсімбаев Р.И., проф., академик (Қазақстан)
Беркінбаев С.Ф., проф., (Қазақстан)
Бисенбаев А.К., проф., академик (Қазақстан)
Бишимбаева Н.Қ., проф., академик (Қазақстан)
Ботабекова Т.К., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Bosch Ernesto, prof. (Spain)
Давлетов Қ.К., ассоц.проф., жауапты хатшы
Жансұтрова Л.Б., б.ғ.к., проф. (Қазақстан)
Ellenbogen Adrian, prof. (Tel-Aviv, Israel),
Жамбакин Қ.Ж., проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Заядан Б.К., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Ishchenko Alexander, prof. (Villejuif, France)
Исаева Р.Б., проф., (Қазақстан)
Қайдарова Д.Р., проф., академик (Қазақстан)
Кохметова А.М., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Күзденбаева Р.С., проф., академик (Қазақстан)
Локшин В.Н., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Лось Д.А., prof. (Мәскеу, Ресей)
Lunenfeld Bruno, prof. (Израиль)
Макашев Е.К., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Миталипов Ш.М., (Америка)
Муминов Т.А., проф., академик (Қазақстан)
Огарь Н.П., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Омаров Р.Т., б.ғ.к., проф., (Қазақстан)
Продеус А.П., проф. (Ресей)
Purton Saul, prof. (London, UK)
Рахыпбеков Т.К., проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Сапарбаев Мұрат, проф. (Париж, Франция)
Сарбасов Дос, проф. (Хьюстон, АҚШ)
Тұрысбеков Е.К., б.ғ.к., асс.проф. (Қазақстан)
Шарманов А.Т., проф. (АҚШ)

«ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медициналық сериясы».

ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Үлттүк ғылым академиясы» РКБ (Алматы қ.).

Қазақстан республикасының Мәдениет пен әкпарат министрлігінің Ақпарат және мұрагат комитетінде 01.06.2006 ж. берілген №5546-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куәлік.

Мерзімділігі: жылдан 6 рет.

Тиражы: 300 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28; 219, 220 бөл.; тел.: 272-13-19, 272-13-18;
<http://biological-medical.kz/index.php/en/>

© Қазақстан Республикасының Үлттүк ғылым академиясы, 2020

Типографияның мекенжайы: «NurNaz GRACE», Алматы қ., Рысқұлов көш., 103.

Г л а в н ы й р е д а к т о р

академик НАН РК, д.м.н., проф.
Ж. А. Арзыкулов

Абжанов Архат, проф. (Бостон, США),
Абелев С.К., проф. (Москва, Россия),
Айтхожина Н.А., проф., академик (Казахстан)
Акшулаков С.К., проф., академик (Казахстан)
Алчинбаев М.К., проф., академик (Казахстан)
Батпенов Н.Д., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Березин В.Э., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Берсимбаев Р.И., проф., академик (Казахстан)
Беркинбаев С.Ф., проф. (Казахстан)
Бисенбаев А.К., проф., академик (Казахстан)
Бишимбаева Н.К., проф., академик (Казахстан)
Ботабекова Т.К., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Bosch Ernesto, prof. (Spain)
Давлетов К.К., ассоц. проф., ответственный секретарь
Джансугурова Л. Б., к.б.н., проф. (Казахстан)
Ellenbogen Adrian, prof. (Tel-Aviv, Israel),
Жамбакин К.Ж., проф., академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Заядан Б.К., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Ishchenko Alexander, prof. (Villejuif, France)
Исаева Р.Б., проф. (Казахстан)
Кайдарова Д.Р., проф., академик (Казахстан)
Кохметова А.М., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Кузденбаева Р.С., проф., академик (Казахстан)
Локшин В.Н., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Лось Д.А., prof. (Москва, Россия)
Lunenfeld Bruno, prof. (Израиль)
Макашев Е.К., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Миталипов Ш.М., (Америка)
Муминов Т.А., проф., академик (Казахстан)
Огарь Н.П., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Омаров Р.Т., к.б.н., проф. (Казахстан)
Продеус А.П., проф. (Россия)
Purton Saul, prof. (London, UK)
Рахыпбеков Т.К., проф., чл.-корр. (Казахстан)
Сапарбаев Мурат, проф. (Париж, Франция)
Сарбасов Дос, проф. (Хьюстон, США)
Турысбеков Е. К., к.б.н., асс. проф. (Казахстан)
Шарманов А.Т., проф. (США)

«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская».

ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 (Print)

Собственник: ПОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы).

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год.

Тираж: 300 экземпляров.

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28; ком. 219, 220; тел. 272-13-19, 272-13-18;
<http://biological-medical.kz/index.php/en/>

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2020

Адрес типографии: «NurNazGRACE», г. Алматы, ул. Рыскулова, 103.

Editor in chief

Zh.A. Arzykulov,
academician of NAS RK, Dr. med., prof.

Abzhanov Arkhat, prof. (Boston, USA),
Abelev S.K., prof. (Moscow, Russia),
Aitkhozhina N.A., prof., academician (Kazakhstan)
Akshulakov S.K., prof., academician (Kazakhstan)
Alchinbayev M.K., prof., academician (Kazakhstan)
Batpenov N.D., prof., corr. member (Kazakhstan)
Berezin V.Ye., prof., corr. member (Kazakhstan)
Bersimbayev R.I., prof., academician (Kazakhstan)
Berkinbaev S.F., prof. (Kazakhstan)
Bisenbayev A.K., prof., academician (Kazakhstan)
Bishimbayeva N.K., prof., academician (Kazakhstan)
Botabekova T.K., prof., corr. member (Kazakhstan)
Bosch Ernesto, prof. (Spain)
Davletov Kairat, PhD, associate professor, executive Secretary
Dzhansugurova L.B., Cand. biol., prof. (Kazakhstan)
Ellenbogen Adrian, prof. (Tel-Aviv, Israel),
Zhambakin K.Zh., prof., academician (Kazakhstan), deputy editor-in-chief
Ishchenko Alexander, prof. (Villejuif, France)
Isayeva R.B., prof. (Kazakhstan)
Kaydarova D.R., prof., academician (Kazakhstan)
Kokhmetova A., prof., corr. member (Kazakhstan)
Kuzdenbayeva R.S., prof., academician (Kazakhstan)
Lokshin V.N., prof., corr. member (Kazakhstan)
Los D.A., prof. (Moscow, Russia)
Lunenfeld Bruno, prof. (Israel)
Makashev E.K., prof., corr. member (Kazakhstan)
Mitalipov Sh.M. (America)
Muminov T.A., prof., academician (Kazakhstan)
Ogar N.P., prof., corr. member (Kazakhstan)
Omarov R.T., cand. biol., prof. (Kazakhstan)
Prodeus A.P., prof. (Russia)
Purton Saul, prof. (London, UK)
Rakhypbekov T.K., prof., corr. member (Kazakhstan)
Saparbayev Murat, prof. (Paris, France)
Sarbassov Dos, prof. (Houston, USA)
Turysbekov E.K., cand. biol., assoc. prof. (Kazakhstan)
Sharmanov A.T., prof. (USA)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.

ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty).

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006.

Periodicity: 6 times a year.

Circulation: 300 copies.

Editorial address: 28, Shevchenko str. of. 219, 220, Almaty, 050010; tel. 272-13-19, 272-13-18;
<http://biological-medical.kz/index.php/en/>

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2020

Address of printing house: «NurNaz GRACE», 103, Ryskulov str, Almaty.

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

ISSN 2224-5308

Volume 2, Number 338 (2020), 56 – 61

<https://doi.org/10.32014/2020.2519-1629.13>

UDC 599.32+37(574) (091)

D. U. Seksenova¹, B. K. Esimov¹, Z. A. Ibragimova²

¹Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan;

²Almaty University, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: s.dana_1971@mail.ru, esimov.bolat@mail.ru, ibragimovat@mail.ru

SARCOCYSTIS IN SOME RODENTS AND BIRDS

Abstract. Sarkosporidiosis is a chronic animal disease that often results in death. In animals with severe damage to the body by sarkosporidiosis, weakness, tissue depletion and hydremia are observed. Sarcocyst development occurs in muscle cells and tissues.

It is known that in vivo predators become infected by eating meat from animals affected by sarcocysts. Sarcocysts secrete toxic substances, sarcocystin and sarcosporiocin, which lead to the death of animals within 5-20 hours.

In chronic conditions in animals, salt deposits form around numerous sarcocysts and pronounced skeletal muscle hydremia is also observed. Sarcocystosis can be detected only after the death of animals. The corpses of animals must be examined microscopically, severely damaged corpses should be buried to a depth of 2 meters. When conducting microscopic studies of slices taken from samples of affected animal meat, a diagnosis is established.

The proposed work is devoted to study the fauna and cycles of the development of micromorphology of representatives of the genus *Sarcocystis* of some rodents and birds. To achieve this research, an experiment was conducted with small vertebrates. The goal of our work is to identify the distribution of sarcosporidia of some species of rodents and birds, to study the morphology of the detected sarcosporidia, and their life cycle. The results of the study can be used for the epizootological characterization of sarcocystosis of rodents and birds. The study of the life cycle and specific structure is necessary for the diagnosis of species of the genus *Sarcocystis*. Yellow ground squirrel, house mouse and chukar can serve as a laboratory example in the study of mammalian and bird sarcocystosis. Ultrastructure materials and the life cycle of sarcosporidia can be used in studying the courses "Parasitology" and "Invertebrate Zoology". There are 5 articles that were published on materials of this work.

Key words: sarcocyst, sarcosporidiosis, fauna, development cycle, micromorphology, definitive host, schizogony, gametogony, sporogony, merozoite.

Introduction. Sarcosporidia – parasitic species belonging to genus Sporozoa, class Sarcocystis and is widespread in wildlife. It is found in various mammals species, including humans, birds, and reptiles in the different parts of the globe. Contamination of farm animals by sarcosporidia has reached 60 %.

Infection by *Sarcocystis* is more common in the relatively immotile animals (in marmots – 41 %, in alectoris – 2-5.7 %). Sarcosporidia in wild animals are studied to a lesser extent than in farm animals. Bearing in mind the detriments to farm animal, it can be used to predict that they control the wild animals' population number.

Life cycle of Sporocystis depends on its intermediate and terminal hosts and is related to its trophic connections.

Materials and Research Methods. Research was conducted in 2018-2019 in the research complex-laboratory of the Institute of Geography and Natural Sciences and in the laboratory of invertebrate zoology in the Faculty of Biology.

Target of the research is the Southeastern part of Kazakhstan, in other words, Almaty region. Species found in the studied areas and brief information about each species are shown below.

While samples were studied by the compressive method, Darling's method was used to extract Sporocysts from the intermediate hosts. Skeleton, diaphragm, and cardiac muscles were used in the samples. By compressive method, muscles with the volume of 3x3x10 mm were pressed by two glasses; then, cysts were counted.

Cystozooids were studied in the drops of sterile physiologic solution; then, preparations were stained according to Romanowsky-Giemsa staining and placed in methanol smears.

For the experimental study of the life cycle of Sarcosporidia, we used the following animals as the final host: a cat (*Felis catus*). During the study of sexual reproduction of Sarcosporidia, it was found by the samples taken from the final hosts that they were infected by preying on intermediate hosts. During the electro-microscopic examination of the cystic phase of Sarcosporidia, yellow ground squirrel, house mice, and bird muscles, which were slaughtered on the 27th, 40th and 120th days after being infected by sporocysts, were used as a special study material [2].

Results and discussion. Life cycle and fauna of the sarcocysts in yellow ground squirrel (*Spermophilus fulvus*).

Table 1 – Research results of sarcocysts in yellow ground squirrel

Year	Studied	Infected %	Studied	Infected %	Studied	Infected %	Identified		In one season
							S.cv	S.cb	S.cv, S.cb
2018	379	28(7.4)	181	13 (7.2)	198	15(7.6)	26	–	2
2019	192	17(8.8)	105	12(11.4)	84	5(5.9)	13	3	1
Total	571	45	286	25	282	20	39	3	3

Note: S.cv – *Sarcocystis citellivulpes*.
S.cb – *Sarcocystis citellibuteonis*.

Yellow ground squirrels were caught in their natural habitats. In the muscles of yellow ground squirrel, slaughtered on the 27th day, tiny 14.4x7 µm cysts with intermediate cells, metrocyes, and a few merozoites were found. On the 40th day, a large, 8-14x16-32 µm, with the same types of cells, cysts were found. After infection on the 138th day, 28-420x140-840 µm, large, thin-walled, mature sarcocysts were found. These sarcocysts were further investigated under the electron microscope [3].

As shown in the results of the research, *Sarcocystis citellivulpes* (5.6 %) is most common species in yellow ground squirrels, it is mainly transmitted by Canidae(dogs), but *Sarcocystis citellibuteonis* is seen rarely.

Life cycle and fauna of the sarcocysts in house mice (*Mus musculus*).

Investigation of house mice, which were caught in different parts of Almaty, revealed the variety of their infection. It was due to the density of house mice population and cats being the definitive host [4].

Table 2 – Research results of the sarcocysts in house mice (*Mus musculus*)

Studied	Infected %	Studied	Infected %	Studied	Infected %
52	5(9, 3)	28	2(8,7)	30	3(10)

In 'native' preparations, parasites appeared to be like wide thread, with the value of 150-630x10500-11000 µm. Little amount of cysts were found in the muscle samples. The size of the wall is 2.8-3.5 µm. Merozoites with the value of 2.8-4, 9x14.0-14.5 µm resembling banana and half of Sun emerge from cysts [5,6].

Table 3 – Comparative information of sarcocysts in house mice

Type	Definitive host	Cyst size (μm)	Size of cyst walls (μm)	Value		Authors, year
				Merozoits (μm)	Sporocysts (μm)	
S. murus	Cat	500-600	–	4-6x14-16	7.5-9, Ox 8,7 -11.7 (8.5x10.3)	Ruiz, Frenkel, 1976
S.murus	Cat	20-130x 4230-8500	0.,5-1,5	3.9-6.5x 10.7-16.9	7.2-8.7x8.7-11,6	Levitt, 1984
S.musmustellis	Weasel	150-630x 1000-10500	2.,8-3.5	2.8-4.9x 14.0-14.5	9 -9.8x 12.2-12.6 (9.6x12.6)	Pak, Orazalinova, Fedoseenko, 1993
S.disperse	Owl	80-90x20-30		8-9x4	11-14x8-12	Cerna, 1977
S.crotali	Rattlesnake	500-4000			7.9x10.8	Enzeroth, Chobotar, Scholtyseck, 1985
S.murivi pera	Palestinian viper	150-400x 5000-8000	3,5 *	7x1,3	9.6x12.2 (8.8-10.5)x(11.7-12.9)	Matuschka, Heydorn, Mehinhorn, et.al., 1987

Sarcocysts in chukars (*Alectoris chucar*).

Adult chukars, which were accidentally infected with sarcosporidia, in hunting business in Ile Alatau, Almaty region in 2018-2019 were studied.

To identify the sarcocysts in chukars, ‘native’ preparations of thigh, chest, and cardiac muscles were used with the light microscope in low magnitude. To identify the life cycle of sarcosporidia in the muscles of chukars, predators were fed by them; then, via analysis, presence of sarcosporidia was determined.

Research results of sarcocysts in chukars are depicted in table 4. As it is shown in the table, infection by sarcocysts was high for chukars. Males were more prone to infection; thigh muscles were especially damaged, but they were absent in cardiac muscles [8,9].

Table 4 – Research results of sarcocysts in chukars

Year	Studied	Infected %	Studied	Infected %	Studied	Infected %	Identified		In one season
							S.av	S.ab	S.av, S.ab
2018	45	4 (9,5)	20	2(10)	10	2 (20)	16	–	–
2019	22	2(9,8)	9	2(10,5)	12	1(10,2)	4	1	3
Total	67	6	29	4	22	3	20	1	3

Note: S.av – *Sarcocystis alectorivulpes*.
S.ab – *Sarcocystis alectoributeonis*.

Table 5 – Comparative information of sarcocysts in chukars

Type	Definitive host	Cyst size (μm)	Size of cyst walls (μm)	Value	
				Merozoits (μm)	Sporocysts (μm)
Sarcocystis alectorivulpes	Fox, Corsac fox	20-560x 530-9750	2.0-2.8	2.1-4.2 x 9.8-14.0	8.4-9.8x II,9-13.3
Sarcocystis alectoributeonis	Buzzard	52-130x 260-2600	0.5-1.0	1.4-2.1x 7.0-8.4	8.4-10.5x II,2-14.7

Conclusions. As a result of the research, two types of sarcocysts *Sarcocystis citellivulpes*, *Sarcocystis citellibuteonis* were identified. *Sarcocystis citellivulpes* (5.6%) was more common, its main carrier was Canidae (dogs), while *Sarcocystis citellibuteonis* was seen rarely (0.5%).

5 types of sarcocysts were found in house mice. They are *Sarcocystis murus*, *Sarcocystis musmustellis*, *Sarcocystis disperse*, *Sarcocystis crotali*, *Sarcocystis murivipera*. Definitive hosts are: cat, weasel, owl, rattlesnake, and Palestinian viper.

Research results of sarcocysts in chukars are depicted in Table 4. As it is shown in the table, infection by sarcocysts was high for chukars. Males were more prone to infection; thigh muscles were especially damaged, but they were absent in cardiac muscles. Two types of sarcocysts (*Sarcocystis alectorivulpes*, *Sarcocystis alectoributeonis*) were found in chukars.

Д. У. Сексенова¹, Б. К. Есимов¹, З. А. Ибрагимова²

¹Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан;

²Алматы университеті, Алматы, Қазақстан

КЕЙБІР КЕМІРГІШТЕР МЕН ҚҰСТАРДАҒЫ SARCOCYSTIS

Аннотация. Саркоспоридиоз – жануарлардың жиі өліммен аяқталатын созылмалы ауруы. Организм саркоцисталармен қатты закымдалған уақытта, жануарларда әлсіздік, азу, ұлпалардың гидремиясы байқалады. Саркоцисталардың дамуы бұлшықет жасушалары мен ұлпаларында өтеді.

Табиги жағдайда жыртқыш жануарлар саркоцисталармен закымдалған ауру жануарлардың етін жеген кезде жүқтұратыны белгілі. Саркоцисталар саркоцистин және саркоспориоцин деп аталатын улы заттар боледі, олар жануарларды 5-20 сағат ішінде өлімге дұшар етеді.

Саркоцисталармен сүткоректілер, атап айтсақ еліктер, бұғылар, қабандар, қояндар, егеуқұйрықтар, тышқандар, үй жануарлары және құстар (жабайы үйректер) закымданады. Жабайы жануарлардың саркоцистоздарының этиологиясында осы паразиттердің бірнеше түрлері белгілі, олар елікте (жұтқыншақ бұлшықетінде, тіл тамырларында); қабанда (барлық көлденең салалар бұлшықеттерінде, көбінесе диафрагма бұлшықетінде, тілдің ұшында, құрсақ қабырғаларында, жүрек бұлшықетінде); қояндарда (қанқаның барлық бұлшықеттерінде); үйректерде (қаңқаның бұлшықеттерінде) кездеседі. Цисталар бұлшықетаралық дәнекер ұлпасында орналасқан.

Саркоцисталармен залалданған ірі қара малдың және шошқаның шикі етін жегеннен кейін, дефинитивті иесі нәжістерімен бірге спороцисталарды бөле бастайды. Адамдар жануарлардың шикі саркоцистоздың еттерін пайдаланған кезде, сондай-ақ шикі етпен жанақсан жағдайда немесе жеке гигиенаны сақтамаған кезде, саркоспоридиоз ауруын жүқтұруы мүмкін.

Саркоцистоз кезінде инкубациялық кезең өте ұзак уақыт жүреді, жануарлар қатты закымдалған жағдайда, ең бірінші байқалатын белгісі – азу. Жақ асты және көкірек аймактарында ісінулер айқын байқалады, жануарлардың қозғалысы нашарлайды, көп жата береді, кейбір жағдайда өлімге әкеледі, егерде ауру жануарлар саркоспоридиоз ауруымен әлсіз закымдалған жағдайда, аурудың клиникалық белгілерін жыл бойы тасымалдауды мүмкін.

Саркоспоридиоз ауруымен өлген жануарларда, ең алдымен, азу көзге түседі. Олардың ішкі паренхиматозды мүшелерінде күрт айқын көрінетін өзгерістер байқалмайды, бірақ мүшелерінің қолемдерінің кішірейгенін анық байқауға болады. Диафрагмада, құрсақ бөлімінде, тілдің тамырларында, жүрек бұлшықеттерінде сопакша келген ақ немесе сұр қосылыстарды, яғни саркоцисталарды көруге болады.

Созылмалы болған жағдайда көптеген саркоцисталармен қатар олардың айналасында эк тұздардың шогіндісі пайда болады және сондай-ақ қаңқа бұлшық еттерінде айқын гидремия орын алады. Саркоцистозды тек жануарлар өлгеннен кейін ғана анықтай аламыз. Олардың өлексерлерін міндепті түрде микроскопиялық түрде зерттеу кажет, қатты закымдалған өлексерлерді 2 метрлік терендікте көму керек.

Закымдалған мал етінің сынамаларынан алынған кесінділерге микроскопиялық зерттеулер жүргізу арқылы диагноз қойылады. Саркоцисталардың бұлшықет талшықтарында және бұлшықетаралық дәнекер ұлпаларында оқшауланатынын анықтап көрдік. Саркоцистозben күрес жүргізу шаралары әлі де болса он нәтижелерін бермей келеді.

Ұсынылып отырған жұмыс кейбір кеміргіштер мен құстардағы *Sarcocystis* туысы өкілдерінің фаунасын, даму циклдарын және микроморфологиясын зерттеуге арналған. Осы зерттеуге қол жеткізу үшін, ұсақ омыртқалы жануарлармен эксперимент жүргізілді. Біздің жұмысымыздың мақсаты – кеміргіштер мен құстардың кейбір түрлерінде саркоспоридиялардың таралуын анықтау, табылған саркоспоридиялардың морфологиясын, олардың тіршілік циклын зерттеу.

Зерттеу нәтижелері кеміргіштер мен құстардың саркоцистоздарының эпизоотологиялық сипаттамасы үшін пайдаланылуы мүмкін. Даму циклы мен накты құрылымды зерттеу *Sarcocystis* туысының түрлерін диагностикалау үшін кажет. Зорман, үй тышқандары, кекіліктер сүткоректілер мен құстардың саркоцистоз-

дарын зерттеу кезінде зертханалық үлгі ретінде алынады. "Паразитология" және "Омыртқасыздар зоологиясы" курсын оқып үйрену барысында ультрақұрылымы мен даму циклы бойынша материалдарды пайдалануға болады. Осы жұмыс негізінде 5 макала жарық көрді.

Түйін сөздер: саркоциста, саркоспоридиоз, фауна, даму циклы, микроморфология, мерозоит, дефинитивті іесі, шизогония, гаметогония, спорогония.

Д. У. Сексенова¹, Б. К. Есимов¹, З. А. Ибрагимова²

¹КазНПУ им. Абая, Алматы, Казахстан;

²Алматинский университет, Алматы, Казахстан

SARCOCYSTIS У НЕКОТОРЫХ ГРЫЗУНОВ И ПТИЦ

Аннотация. Саркоспоридиоз является хроническим заболеванием животных, которое часто заканчивается летальным исходом. У животных при сильном поражении организма саркоспоридиозом наблюдается слабость, истощение и гидремия тканей. Развитие саркоцистов происходит в мышечных клетках и тканях.

Известно, что в естественных условиях хищные животные заражаются при употреблении мяса животных пораженных саркоцистами. Саркоцисты выделяют ядовитые вещества, саркоцистин и саркоспироцин, которые приводят к летальному исходу животных в течение 5-20 часов.

Саркоцистами поражаются косули, олени, кабаны, кролики, крысы, мыши, домашние животные и дикие утки. В этиологии саркоцистозов диких животных известны несколько видов этих паразитов, которые встречаются у косуль (в мышцах глотки, в корнях языка), у кабана (во всей поперечнополосатой мускулатуре, преимущественно в мышцах диафрагмы, кончиках языка, брюшной стенке, и в сердечной мышце), у кроликов (во всех скелетных мышцах), у уток (в скелетных мышцах). Цисты расположены в межмышечной соединительной ткани.

После приема сырого мяса крупного рогатого скота и свиней, зараженных саркоцистами, дефинитивный хозяин с фекалиями начинает выделять спороцисты. Человек может заразиться саркоспоридиозом при употреблении сырого мяса, зараженного саркоцистозом животных, и при не-соблюдении личной гигиены.

При саркоцистозе инкубационный период продолжается очень длительное время, и при сильном поражении животные подвергаются истощению. Животные плохо передвигаются, больше находятся в состоянии лежа, в подчелюстной и грудной области отмечаются отеки. В некоторых случаях заболевание приводит к гибели животного. При слабом поражении больные животные могут переносить клинические признаки заболевания в течение года.

При болезни саркоспоридиозом в первую очередь наблюдается истощение организма животных. Во всех внутренних паренхиматозных органах резко выраженных изменений не наблюдается, но можно заметить уменьшение размеров органов животных. Можно увидеть саркоцисты – овальные белые или серые соединения – в диафрагме, в брюшной части, в корнях языка и в мышцах сердца.

При хронических состояниях у животных вокруг многочисленных саркоцист образуются отложения солей и также наблюдается выраженная гидремия скелетных мышц. Саркоцистоз можно обнаружить только после смерти животных. Трупы животных необходимо микроскопически исследовать, сильно поврежденные трупы следует погребать на глубину 2 метров.

При проведении микроскопических исследований срезов, приготовленных из проб пораженного мяса животных, устанавливается диагноз. Можно увидеть, что саркоцисты изолировано находятся в мышечных волокнах и межмышечных соединительных тканях. Меры по борьбе с саркоцистозом все еще не дают положительных результатов.

Предлагаемая работа предназначена для изучения фауны, циклов развития и микроморфологии представителей рода *Sarcocystis* некоторых грызунов и птиц. Для достижения этого исследования был проведен эксперимент с мелкими позвоночными животными. Целью нашей работы является выявление распространения саркоспоридий в некоторых видах грызунов и птиц, изучение морфологии обнаруженных саркоспоридий, их жизненного цикла.

Результаты исследования могут быть использованы для эпизоотологической характеристики саркоцистозов грызунов и птиц. Изучение цикла развития и конкретной структуры необходимо для диагностики видов рода *Sarcocystis*. Желтый суслик, домашние мыши, кеклик могут служить лабораторным примером при исследовании саркоцистозов млекопитающих и птиц. При изучении курса «Паразитология» и «Зоология беспозвоночных» можно использовать материалы по ультраструктуре и циклу развития. На основе этой работы опубликовано 5 статей.

Ключевые слова: саркоциста, саркоспоридиоз, фауна, цикл развития, микроморфология, мерозоит, дефинитивный хозяин, шизогония, гаметогония, спорогония.

Information about authors:

Seksenova Dana Uzakovna, senior lecturer of biology department of Abai KazNPU; s.dana_1971@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0002-3017-9713>

Essimov Bolat Kabdushevich, Doctor of Science (Biology), docent of biology department of Abai KazNPU; esimov.bolat@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0002-2575-5659>

Ibragimova Zeinep Amantayevna, Candidate of Science (Pedagogy), docent of biology department of Almaty University; ibragimovat@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0003-1385-3312>

REFERENCES

- [1] Badaev A. (1989). Sarkotsisty zheltykh suslikov (Citellus fulvus) [Sarcocysts of yellow gophers (Citellus fulvus)]. *Biol. Journal.*, 6, 40-42 (in Russ.).
- [2] Pak L.S., Sychev I.L. (1986). Sarkosporidii zheltogo suslika (Citellus fulvus) [Sarcosporidia of yellow gophers (Citellus fulvus)]. *Mat-ly X nauchnoi konf. Ukrainskogo obshch. parazitologov Proceedings of X Conference of the Ukrainian Scientific Society of Parasitologists*, 2, 92. Kiev (in Russ.).
- [3] Pak S.M., Pak L.S., Skliarova O.N. (1989). Sarcocystis citellibuteonis - novyi vid sarkosporidii iz zheltogo suslika (Citellus fulvus) [Sarcocystis citellibuteonis – new sarcosporidium species from yellow gopher (Citellus fulvus)]. *Izv. AN Kaz SSR. Ser. biol -Izv. AN KazSSR (News of AS KazSSR). Biol. Series*, 3, 30-33. M. (in Russ.).
- [4] Pak L.S., Orazalinova V.A., Fedosseyenko V.M. (1993). Novyi vid sarkosporidii Sarcocystis musmustelis sp.n. u domovykh myshei (Mus musculus) s okonchatelnym khoziainom laskoi (Mustela nivalis) [New sarcosporidium species Sarcocystis musmustelis sp.n. of house mouse (Mus musculus) with a weasel (Mustela nivalis) as a terminal host]. *Izv. AN Kaz SSR. Ser. biol -(News of AS KazSSR). Biology series*, 2, 31. M. (in Russ.).
- [5] Levitt A.V. (1984). Izuchenie sarkosporidii domovykh myshei v eksperimente [Research of sarcosporidia of house mice in an experiment]. *Sarkosporidii zhivotnykh v Kazakhstane - Sarcosporidia of animals in Kazakhstan*, 116, 132. Alma-Ata (in Kaz.).
- [6] Fedosseyenko V.M. (1989). Nachalnaia faza obrazovaniia tsist sarkosporidii Sarcocystis dispersa [The initial phase of sarcosporidium. Sarcocystis dispersa cyst Formation]. *L[HTO] jaonw*, 31, N 2. M. (in Russ.).
- [7] Cerna Z. (1983). Reproduction of merozoites of Sarcocystis dispersa Cerna, Kolarova et sulk. 1978 and Sarcocystis cerne Levine, 1977 in the blood stream of an intermediate host. *Folia Parasitol*, 30, N 1, 5-8.
- [8] Pak S.M., Sklyarova O.N., Pak L.S. (1989). Sarcocystis alectorivulpes i Sarcocystis alectoributeonls - novye vidy sarkosporidii keklikov (Alectoris chucar) [Sarcocystis alectorivulpes and Sarcocystis alectoributeonls – new species of sarcosporidia of chukars (Alectoris chucar)]. *Izv. AN Kaz SSR. Ser. biol. Izv. AN KazUSR (News of AS KazUSR). Biology series*. 6, 25-30. Alma-Ata (in Kaz.).
- [9] Cerna Z., Krasnovska Z. (1986). Life cycle involving bird-bird relation in Sarcocystiscoccidia with the description of Sarcocystis accipiter sp.n. *Folia Parasitol*, 33, 305-309. Kiev (in Russ.).

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz

ISSN 2518–1629 (Online), ISSN 2224–5308 (Print)

<http://biological-medical.kz/index.php/en/>

Редакторы: М. С. Ахметова, Г. Б. Халидуллаева, Д. С. Аленов

Верстка на компьютере Д. А. Абдрахимовой

Подписано в печать 02.04.2020.

Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.

5,5 п.л. Тираж 300. Заказ 2.